


## تعریف برونکوسکوپي:

برونکوسکوپي اقدام تشخیصی و گاهی درمانی است. لوله دستگاه برونکوسکوپ از بینی یا دهان وارد راه های هوایی شده و از طریق آن پزشک قادر به مشاهده مستقیم داخل مجاری هوایی و سیستم تنفسی می باشد.



برونکوسکوپي هنگامی انجام می شود که پزشک از طریق شرح حال، تاریخچه بیماری، عکس قفسه سینه و سی تی اسکن نتواند تشخیص قطعی جهت نوع بیماری بدهد، گاهی نیز تشخیص داده شده امام برای درمان انجام می شود.

## موارد زیر را قبل از انجام برونکوسکوپي رعایت کنید:

- قبل از انجام برونکوسکوپي بیمار یا کسی که کفالت او را به عهده دارد باید برگه رضایت عمل را به دقت خوانده و سپس امضاء کند.  
- داشتن یک نفر همراه الزامی است.

- از ۸ ساعت قبل از انجام برونکوسکوپي باید ناشتا باشید.

- در صورت داشتن قطعات فلزی، دندان مصنوعی، لنزهای چشمی و زیور آلات، آنها را خارج کنید.

- در صورتی که داروی خاصی مصرف می کنید مانند داروهای ضد انعقاد، داروهای قلبی، ضد فشار خون بالا، آسپرین و داروی کاهش دهنده قند خون و ... به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید.  
- در صورت داشتن هر گونه حساسیت دارویی به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید.

## داشتن مدارک زیر جهت انجام برونکوسکوپي در بیماران سرپایی الزامی است:

- دستور پزشک متخصص ریه بیمارستان جهت انجام برونکوسکوپي.  
- گرافی قفسه سینه.  
- برای خانم های بالای ۵۰ سال و آقایان بالای ۴۰ سال داشتن نوار قلب الزامی است. (چنانچه شرح حال بیماری قلبی داشته باشد)  
- جواب منفی سه نوبت اسمیر خلط از نظر باسیل سل طبق نظر پزشک می باشد.  
موارد زیر را در حین انجام برونکوسکوپي برای شما انجام می شود:



- داروی بی حسی موضعی به صورت اسپری در دهان شما استفاده می شود.

- در حین برونکوسکوپي باید از طریق بینی و یا از راه دهان نفس بکشید.

- اکسیژن از طریق سوند بینی برای شما گذاشته می شود.



- از دستگاهی به نام پالس اکسی متر جهت اندازه گیری میزان اکسیژن اشباع شده خون شریانی استفاده می شود، که به صورت گیره نوک انگشت متصل شده و داخل آن یک منبع نوری است.

- بیمار عزیز لطفاً همکاری لازم را در هنگام انجام برونکوسکوپي با پزشک و پرستار خود داشته باشید.

## موارد زیر را بعد از انجام برونکوسکوپي رعایت کنید:

بیماران سر پایی به مدت نیم ساعت در بخش برونکوسکوپي تحت نظر می باشند.

- تا وقتی که بتوانید آب دهان خود را قورت دهید نباید از راه دهان چیزی بخورید، این زمان معمولاً ۱ الی ۲ ساعت بعد از انجام برونکوسکوپي طول می کشد.

- بهتر است برای شروع خوردن از مایعات بجز آبمیوه های قرمز رنگ استفاده کنید.

