

آرزوی ما، سلامتی، بهبود وضعیت و طول عمر شماست.



Shahid Beheshti Medical and Education Center

مراقبت‌های فیستول



تبیه کننده: فریبا دهقانی
کارشناس امور سلامت

مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی شهید دکتر بهشتی قم



Shahid Beheshti Medical and Education Center



آدرس:

قم، بلوار شهید بهشتی، مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی شهید دکتر بهشتی

تلفن: ۶۱۲۲۸۵۵۵ فکس: ۶۱۲۲۰۰۰

bmc.muq.ac.ir

محل فیستول و فشار خون پایین در فیستول و انحراف خون شریانی به ورید اتفاق می‌افتد.

مراقبت‌های قبل از استفاده و شروع عمل همودیالیز:

- حداقل ۴ - ۶ هفته زمان لازم است که به اصطلاح فیستول بررسد و آماده استفاده گردد.
- قبل از عمل تزریق، عضو فیستول دار را با آب و صابون بشوید.
- فیستول را از نظر کارکرد ارزیابی کنید.
- قبل و بعد از هر تزریق موارد کنترل عفونت را رعایت نمایید.
- محل تزریق بصورت دورانی تمیز و ضد عفونی می‌شود..

- جایت ضد عفونی می‌توان از الکل و بتادین استفاده شود. بدین صورت که در صورت استفاده از الکل تزریق باید در کمتر از یک دقیقه و در صورت استفاده از بتادین تزریق باید پس از ۳ دقیقه انجام شود.

منابع:

- پرستار و دیالیز - نویسنده‌گان؛ شهناز اتابک - مژگان جلال زاده - نشر؛ چاپ صحا
- www.dialysis.com -
- www.google.com -