


شرح بیماری

آمپیم عبارت است از تجمع چرک در یکی از حفرات بدن. معمولاً در فضای اطراف ریه‌ها بین لایه‌های پرده جنب عفونت اتفاق می‌افتد.



علائم و نشانه‌های شایع

✓ درد قفسه سینه. این درد می‌تواند از یک ناراحتی مبهم تا درد تند و تیز، متغیر باشد. درد غالباً با سرفه یا تنفس بدتر می‌شود و ممکن است به قسمت پایینی قفسه سینه یا شکم گسترش یابد.

- ✓ تنفس تند و سطحی
- ✓ لرز
- ✓ تب
- ✓ خستگی شدید
- ✓ سرفه خشک
- ✓ تنفس بد بو
- ✓ کاهش وزن
- ✓ تعرق شبانه

تشخیص

- ✓ کشت چرک
- ✓ عکس برداری از قفسه سینه با اشعه ایکس
- ✓ سی تی اسکن قفسه سینه

درمان

توراکوستنزی:

- ✓ در این روش پوست ناحیه قفسه سینه شما تمیز و بی‌حس می‌شود.
- ✓ سوزنی از ناحیه قفسه سینه شما وارد فضای اطراف ریه‌ها شده و به مایعات تجمع یافته اطراف ریه اجازه خروج می‌دهد.
- ✓ سپس مایع برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه فرستاده می‌شود.

دارو درمانی:

از آنتی‌بیوتیک برای مبارزه با عفونت و از استامینوفن برای تخفیف درد می‌توان استفاده کرد.

جراحی:

در صورتی که با استفاده از روش‌های ذکر شده بیمار بهبود نیافت باید جراحی شود.

علل شایع

- ✓ عفونت‌های ریه یا قفسه سینه مانند ذات‌الریه، سل، یا آبسه ریه
- ✓ روی هم خوابیدن ریه یا آسیب به قفسه سینه
- ✓ وجود سرطان در سایر نقاط بدن
- ✓ بیماری‌های درگیر کننده بافت همبند و عروق مانند لوپوس
- ✓ بروز عفونت در نقطه‌ای دیگر از بدن که به قفسه سینه گسترش یافته باشد.

- ✓ نارسایی احتقانی قلب
- ✓ بیماری کلیه
- ✓ بیماری کبد

عوامل تشدید کننده

- ✓ تغذیه نامناسب
- ✓ بیماری اخیر
- ✓ سیگار کشیدن
- ✓ خستگی یا کار زیاد
- ✓ آب و هوای سرد و مرطوب
- ✓ محیط زندگی شلوغ و غیر بهداشتی

- ✓ بدتر شدن تنگی نفس
- ✓ سرفه خشک و بدون خلط
- ✓ تیره شدن بستر ناخن‌های دست و پا

❖ اقدامات قبل از توراکوسنتز

- ✓ آمادگی خاصی برای این آزمون لازم نیست. شما باید پزشک را از کلیه داروهای مصرفی خود آگاه سازید.
- ✓ در صورتی که هر گونه مشکلات مرتبط با خونریزی دارید نیز باید پزشک خود را در جریان قرار دهید.

❖ اقدامات بعد از توراکوسنتز

- ✓ بعد از توراکوسنتز یک عکس با اشعه ایکس از قفسه سینه شما گرفته می‌شود.
- ✓ در صورتی که پس از آزمون فشار خون و تنفس شما مشکلی نداشته باشد می‌توانید مرخص شوید.

❖ عوارض بعد از توراکوسنتز

- ✓ درد
- ✓ خونریزی
- ✓ عفونت
- ✓ جمع شدن ریه

❖ فعالیت

تا چند روز پس از بیماری و تا زمانی که علائم برطرف نشده باشد استراحت کرده و از انجام فعالیت‌های سنگین اجتناب کنید. سپس فعالیت‌های عادی خود را تدریجاً از سرگیرید. بهبود کامل حدود دو ماه زمان می‌برد.

❖ عوارض

- ✓ مننژیت (عفونت پرده پوشاننده مغز)
- ✓ پریکاردیت (عفونت پرده دور قلب)
- ✓ آندوکاردیت (عفونت دریچه‌های قلب)
- ✓ آبسه مغز

❖ درچه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- ✓ تب و لرز
- ✓ ظاهر شدن خون در سرفه.
- ✓ زیاد شدن درد

مرکز آموزشی درمانی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی (ره) قم

جهت دسترسی به مطالب "آموزش بیمار"، به سایت زیر مراجعه فرمائید:

www.bmc.muq.ac.ir