

Predictor variable	متغیر پیش بینی کننده	امتیاز
Active Cancer	بد خیمی فعال	۱
Paralysis Paresis or Recent Cast	فلج کامل، ضعف عضلانی یا بی حرکت کردن اخیر اندام تحتانی به وسیله گچ گرفتن	۱
Bedridden for > 3 Days Major Surgery < 12 Weeks	بستری بیش از سه روز، جراحی بزرگ کمتر از ۱۲ هفته قبل	۱
Tenderness Along Distribution Of Deep Veins	حساسیت هنگام لمس دردناک در طول مسیر سیستم وریدی	۱
Entire Leg Swelling	ورم کردن سر تا سر اندام تحتانی	۱
Unilateral Calf Swelling > 3cm	تورم بیش از ۳ سانتی متر یک ساق در مقایسه با اندام تحتانی مقابل (این اندازه گیری باید ۱۰ سانتیمتر زیر توپروزیته تیپال انجام شود)	۱
Pitting Edema	ادم گوذه گذار که در اندام علامت دار بیشتر باشد	۱
Collateral Superficial Nonvaricose Veins	مشاهده وریدهای غیر واریسی سطحی کولترال	۱
Alternative Diagnosis At Least as Likely as DVT	تشخیص افتراقی دیگری که احتمالی مشابه DVT دارد.	-۲
TOTAL SCORES	امتیاز کل	۸

سطوح ریسک DVT

نمره کسب شده	امتیاز
۳ یا بیشتر	پر خطر
۲ یا ۱	خطر متوسط
۰ یا کمتر	کم خطر